

Sametky: nepříjemní parazité pozdního léta

Pozorujete, že vašeho zvířecího miláčka svědí kůže? Pokud se svědění objevuje kolem očí a uší, v mezíprstí nebo na spodině břicha, je velmi pravděpodobné, že vašeho pejska napadly Sametky podzimní. Sametky žijí v lehkých půdách a během svého rozmnožování vylézají na traviny, kde kladou vajíčka. Z těch se poté vylíhnou šestinohé silně obrvené larvy, které během pozdního léta a na začátku podzimu často napadají jak divoká tak domácí zvířata. Diagnostika je jednoduchá –larvy sametek mají oranžovou barvu a vyskytují se většinou ve shlucích. Svědění vzniká tím, že sametky získávají výživu z těla hostitele. Tito paraziti se živí mimotělně, což znamená, že produkují trávicí enzymy, které natráví hostitelskou tkáň a právě výsledným produktem se živí. Po několika dnech sametky samovolně odpadají a v půdě dokončují svůj vývoj v dospělé jedince. Sametky také mohou napadat člověka, vybírají si především místa, kde oblečení dobře přiléhá k tělu nebo kde dochází ke zvýšenému pocení. Majitelé často zaznamenají svědivé změny u zvířat na kůži až v momentě, kdy parazité svého hostitele už opustili.

Sametky podzimní jsou citlivé na většinu preparátů s obsahem amitrazu, fipronilu nebo pyretroidů. Tyto látky nežádoucí larvy spolehlivě zabijí. Po usmrcení sametek dojde k jejich odpadnutí, kožní záhyby můžeme také vyčistit pomocí tamponu, který je napuštěný účinnou látkou. Jak se sametkám ubránit? V tomto období se doporučuje omezit pohyb v trávě nebo v lese. U zvířat se napadení larvami sametek rychle léčí a nemá žádné následky.

MVDr. Leoš Krkoška, Ph.D.
Veterinární klinika SUCHDOL, s.r.o.